


- 37 術野を左下に移動させ 巨大動脈瘤に収縮剤を少量投与し、周囲に発生した血溜まりを吸引 (巨大動脈瘤→P33、血溜まり→P24)
- 38 術野を上移動させ、血溜まりを吸引しつつ、巨大動脈瘤を摘出し、人工血管と血管の結合部を縫合 (血溜まり→P24、巨大動脈瘤→P33)
- 39 術野を下に移動させ、最後の巨大動脈瘤を摘出し、人工血管と血管の結合部を縫合 (巨大動脈瘤→P33)
- 40 術野を上移動させ 血溜まりを吸引しつつ、腫瘍、小腫瘍を処置する (血溜まり→P24、腫瘍→P26、小腫瘍→P27)
- 41 術野を下に移動させ、血溜まりを吸引しつつ、バイタルを80前後まで回復 (血溜まり→P24、バイタル回復→P23)
- 42 腫瘍×2を特定して処置し、発生した小腫瘍を治療する (腫瘍→P26、小腫瘍→P27)
- 43 胸部の閉創処置を行なう (閉創→P25)
- 44 4人目の患者  
胸部を消毒して切開 (切開→P24)
- 45 ガラス片×4を回収 (異物除去→P25)
- 46 血溜まりをすべて吸引し、ガラス片の傷口を治療 (血溜まり→P24、異物除去→P25)
- 47 術野を右下に移動させ 血溜まりを吸引しつつ、ガラス片×1を回収して傷口を治療 (血溜まり→P24、異物除去→P25)
- 48 術野を左に移動させ ガラス片×2を回収して傷口を治療 (異物除去→P25)
- 49 術野を上移動させ、ガラス片×3を回収して傷口を治療 (異物除去→P25)
- 50 術野を上移動させ、血溜まりを吸引しつつ、ガラス片×2を回収して傷口を治療 (血溜まり→P24、異物除去→P25)
- 51 胸部の閉創処置を行なう (閉創→P25)

The patient is saved!



39  
ここでは右回りの人工血管を使用する。左回りの人工血管が続いていたので、向きに注意してミスな配置しよう。

40  
血溜まりは発生後すぐに吸引。素早く吸引すれば、その分再発も多くなるため、より多くのCHAINが稼げる。

42  
腫瘍を1つずつ処置し、別の場所で血溜まりが発生したらすぐに吸引。左側に隠れている腫瘍を見逃すな。

45  
ガラス片の回収はスピードよりも1つずつ丁寧に抜くこと。スコアアタックでは「Good」でもCHAINが切れてしまう。

46  
画面左上側にも血溜まりが発生するが、できるかぎり術野は移動させずにドレーンだけで吸引してしまいたい。

#### OPERATION RANK

ランク	Extreme
C	0 ~ 21999
B	22000 ~ 24999
A	25000 ~ 27999
S	28000 ~ 29999
XS	30000 ~

# A-4

【スコアアタック・4】

▼ Surgeon



▼ Data

【患者】小腸  
【バイタル】99 (99)  
【手術時間】10:00:00

▼ Notes




前作に登場したギルスとスティグマを同時に除去するステージ。最後にサヴァト、キリアキ・マザークラス、融合したケイルが登場する。

#### ○ 患者のバイタル値と連続執刀クリア目標タイム

- ◇ 1人目/小腸/99 (99) /残り8:36:00 (1分24秒で処置)
- ◇ 2人目/胃/— (99) /残り6:49:00 (1分47秒で処置)
- ◇ 3人目/右肺/— (99) /残り3:45:59 (3分04秒で処置)
- ◇ 4人目/右肺/— (99) /残り0:20:00 (3分25秒で処置)

#### The patient's Life is in your hands

- 1人目の患者  
腹部を消毒して切開 (切開→P24)
- 裂傷×7を縫合 (裂傷→P23)
- 裂傷×2が発生後、臓器内に潜むキリアキを特定して露出させる (キリアキ→P41)
- 露出したキリアキを焼却し、裂傷を縫合する (キリアキ→P41 裂傷→P23)
- 3、4を繰り返し、もう1体のキリアキを焼却する (キリアキ→P41)
- 切開口×2を治療 (キリアキ→P41)
- 3～5を繰り返し、2体のキリアキを焼却する (キリアキ→P41)
- バイタルを回復し、切開口を治療する (バイタル回復→P23、キリアキ→P41)
- 長い裂傷×3と裂傷を縫合 (裂傷→P23)
- 3～5を繰り返し、通常サイズのキリアキを焼却する (キリアキ→P41)
- キリアキ・マザークラスを特定して露出させる (キリアキ→P41)
- 露出したキリアキ・マザークラスにレーザーを当てる (キリアキ→P41)
- 裂傷を縫合 (裂傷→P23)
- 11～13を3回繰り返し、キリアキ・マザークラスを消滅させる (キリアキ→P41)
- 腹部の閉創処置を行なう (閉創→P25)
- 2人目の患者  
腹部を消毒して切開 (切開→P24)
- デフテラが生み出した腫瘍×5を焼却する (デフテラ→P42)



1  
このスコアアタックのみ、術式中にセリフが入る。術式の流れを把握しているなら、スキップ機能を使おう。

3  
キリアキは臓器内を移動して裂傷を生み出す。露出させると裂傷とメスの切開口ができ、その治療も必要になる。

4  
露出させたキリアキは、レーザーを単発で2回当てれば除去可能。続けてレーザーを照射する必要はない。

8  
すべての傷を治療すると次のキリアキが発生する。バイタルが低いなら、切開口を治療するまに回復させよう。

14  
キリアキのマザークラス消滅後、残っている傷を治療すると次に進む。メスの切開口も見落とさないように。